

Quel est le meilleur moment pour débuter un traitement?




Un traitement orthodontique peut être amorcé pour certains problèmes dentaires spécifiques avant que toutes les dents permanentes aient fait éruption en bouche. Le **traitement précoce**, qui est habituellement débuté après que l'éruption des quatre incisives (dents à l'avant) supérieures et inférieures soit complétée (vers l'âge de 7 à 9 ans), est recommandé lorsqu'un des problèmes illustrés sur cette page est présent.


Note : Les dessins de dents ont seulement une fonction illustrative et peuvent différer de l'anatomie actuelle des dents.

Les avantages d'un traitement précoce :


- Protéger des accidents les dents antérieures trop avancées en les repositionnant vers l'arrière.
- Améliorer la relation entre les deux mâchoires, permettant un meilleur développement de celles-ci.
- Tirer profit de la croissance au maximum pour améliorer le succès du traitement.
- Améliorer l'apparence du visage et l'estime de soi.
- Prendre avantage de la bonne coopération du patient à cet âge.
- Possiblement éviter ou réduire le besoin de traitement ultérieur lorsque le patient sera plus âgé.




SURPLOMB HORIZONTAL EXCESSIF Les dents antérieures du haut sont trop avancées par rapport à celles du bas.




OCCLUSION CROISÉE ANTÉRIEURE Les dents antérieures du bas sont trop avancées par rapport à celles du haut.




OCCLUSION FERMÉE Les dents antérieures du haut couvrent les dents du bas de façon excessive.




BÉANCE ANTÉRIEURE Espace entre les dents antérieures du haut et du bas même quand les dents à l'arrière se touchent.




CHEVAUCHEMENT Les dents du haut et/ou du bas se chevauchent.



OCCLUSION CROISÉE POSTÉRIEURE Les dents postérieures du bas sont plus vers l'extérieur que les dents postérieures du haut.



DÉVIATION DES LIGNES MÉDIANES Les lignes du centre de l'arcade supérieure et inférieure ne coïncident pas.



DIASTÈMES Présence d'espaces entre les dents du haut et/ou du bas



Phases d'un traitement orthodontique

Un traitement orthodontique peut être accompli en **une seule phase globale de traitement** ou divisé en **deux phases de traitement distinctes** avec une phase de maintien entre les deux. Le nombre de phases et la durée du traitement dépendent de plusieurs facteurs.

L'orthodontiste vous expliquera les options de traitement et vous signalera les avantages et les désavantages de procéder à un traitement en deux phases ou un traitement complet présentant une seule étape.



PREMIÈRE PHASE

Cette phase de traitement dure généralement de 12 à 18 mois (vers l'âge de 7 à 9 ans) et une grande variété d'appareils peut être utilisée pour corriger des problèmes spécifiques.

- BOÎTIERS – Placés sur les dents permanentes supérieures et parfois inférieures
- APPAREIL D'EXPANSION PALATINE RAPIDE – Appareil fixe utilisé pour augmenter la largeur du maxillaire supérieur (palais)
- APPAREIL DE STIMULATION DE CROISSANCE – Appareil fixe ou amovible employé pour accélérer la croissance des mâchoires
- MASQUE FACIAL – Appareil amovible utilisé lorsque le maxillaire supérieur est en position trop reculée
- TRACTION EXTRA-ORALE – Appareil amovible employé pour déplacer les molaires supérieures vers l'arrière



PHASE DE MAINTIEN

Pendant la période entre la première et la deuxième phase de traitement, les visites de contrôle sont généralement aux 8 à 12 mois. Le patient peut avoir à porter un appareil de rétention durant cette phase.



DEUXIÈME PHASE (si nécessaire)

Au cours de la première phase de traitement, ni l'orthodontiste ou le patient n'a de contrôle sur la position finale de toutes les dents permanentes puisque la majorité de celles-ci demeurent encore en formation. Si des malpositions ou autres anomalies sont observées une fois l'éruption de toutes les dents permanentes complétée, une nouvelle phase de traitement risque d'être nécessaire. À ce moment, le patient est informé des coûts associés à cette deuxième phase. Cette phase de traitement a généralement lieu entre les âges de 12 à 14 ans et sa durée varie de 12 à 26 mois.

TRAITEMENT COMPLET

S'il est recommandé d'attendre, le traitement est initié lorsque toutes les dents permanentes ont achevé leur éruption. Le traitement en une seule phase s'échelonne habituellement sur une période de 20 à 30 mois, le plus souvent vers l'âge de 12 à 14 ans. La durée du traitement dépend de plusieurs facteurs, dont :

- La sévérité du problème
- La coopération du patient
- L'âge du patient
- L'assiduité aux rendez-vous